


Как оказать первую помощь ребенку при боли в животе


1. Отвлечь ребенка при несильной боли, без признаков «острого живота»: дать теплое питье, погладить живот.
2. Предложить ребенку сходить в туалет: боль может уйти после дефекации или ее попытке, если у ребенка вздутие живота.
3. Вызвать скорую помощь или родителей, если ребенок продолжает жаловаться на боль.
4. Не давать обезболивающие лекарства до осмотра врача.



Буклет


Для воспитателей

Как оказать первую помощь ребенку при рвоте, тошноте, боли в животе



Как оказать первую помощь ребенку при рвоте после еды

1. Попросить помощника воспитателя или няню присмотреть за детьми.
2. Отвести ребенка в туалет групповой, умыться, промыть рот, переодеть в чистую одежду.
3. Отвести ребенка в медблок, не допуская его контакта с другими детьми и сотрудниками ДОО.
4. Позвонить родителям, сообщить о случившемся и посоветовать обратиться к врачу.
5. Узнать о диагнозе у ребенка и при необходимости организовать дезинфекцию.



Как оказать первую помощь ребенку при тошноте

1. Предложить ребенку подкисленное питье.
2. Наблюдать за ребенком и его самочувствием.
3. Предложить поиграть в спокойные игры, почитать, порисовать.
4. Разрешить пропустить очередной прием пищи.
5. Отвести ребенка в медпункт, если тошнота не проходит.

